

Orale Antibiotika-Therapie bei Jugendlichen und Erwachsenen

Gruppe	Wirkstoffe	Handelsnamen
Penicilline	Amoxicillin/Clavulansäure Amoxicillin Penicillin V	Clavamox® Ospamox® Ospen®
Cephalosporine	Cefpodoxim-Proxetil Cefuroxim-Axetil Cefalexin	Biocef® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Ospexin®
Makrolide	Azithromycin Clarithromycin Roxithromycin	Azithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz®
Lincosamide	Clindamycin	Clindac®
Fluorchinolone	Levofloxacin	Levofloxacin Sandoz®

Infektionen der Haut und Weichteile, Knochen und Gelenke

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Hautabszesse, Furunkel & Karbunkel, Impetigo (multipel)	<i>S. aureus</i> ²	Cefalexin ³	Ospexin® ⁴	7 Tage ³	Cefuroxim-Axetil ^{2,4} Clindamycin ^{3,4}	Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Clindac Sandoz®
Erysipel akut, unkompliziert	A-Streptokokken ²	Penicillin V ³ Cefalexin ³	Ospen® ⁴ Ospexin®	10 Tage ²	Clindamycin ^{3,4} Clarithromycin ^{3,4} Roxithromycin ³	Clindac Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz®
Bissverletzungen	<i>Pasteurella multocida</i> , <i>S. aureus</i> , Streptokokken, Anaerobier ²	Amoxicillin/Clavulansäure ^{1,3,4}	Clavamox®	7 Tage ³	Clindamycin ³ (exkl. Katzenbisse ²)	Clindac Sandoz®
Akute Osteomyelitis, septische Arthritis, Spondylodiszitis (orale Nachbehandlung nach anfänglicher i.v. Therapie)	Staphylokokken, seltener: Streptokokken, <i>H. influenzae</i> , Enterobakterien ²	Amoxicillin/Clavulansäure ² Cefalexin ^{1,2} Cefuroxim-Axetil ^{1,4}	Clavamox® Ospexin® ⁴ Cefuroxim Sandoz® I Zinnat®	mind. 4-6 Wochen ²	Clindamycin ^{1,2,4}	Clindac Sandoz®

Infektionen der oberen Atemwege

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Angina tonsillaris, Pharyngo-Tonsillitis	A-Streptokokken ²	Penicillin V ¹ Cefalexin ³	Ospen® ⁴ Ospexin® ⁴	5-10 Tage ²	Cefuroxim-Axetil ^{2,4} Cefpodoxim-Proxetil ² Clindamycin ^{3,4} Azithromycin ³ Clarithromycin ³ Roxithromycin ³	Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Biocef® Clindac Sandoz® Azithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz®
Sinusitis akut, Otitis media akut	Pneumokokken, <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i> , A-Streptokokken ²	Amoxicillin ³	Ospamox® ⁴	5-10 Tage ²	Amoxicillin/Clavulansäure ^{1,3,4} Cefuroxim-Axetil ^{1,2,3} Azithromycin ³ Clarithromycin ^{3,4} Roxithromycin ³ Levofloxacin ³	Clavamox® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Azithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz® Levofloxacin Sandoz®
Sinusitis chronisch	<i>S. aureus</i> , Anaerobier, Pneumokokken, <i>H. influenzae</i> , Enterokokken, <i>M.catarrhalis</i> ²	Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,4}	Clavamox®		Clindamycin ^{2,4}	Clindac Sandoz®

Infektionen der unteren Atemwege

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Bronchitis akut ³ (Antibiotika nur bei persistierendem Fieber, älteren Menschen, erhöhtem CRP)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>M. catarrhalis</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , Mykoplasmen, <i>C. pneumoniae</i> ²	Azithromycin ^{2,4} Clarithromycin ² Roxithromycin ²	Azithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz®	5-7 Tage ²	Amoxicillin ² Cefuroxim-Axetil ¹ Cefpodoxim-Proxetil ¹	Ospamox® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Biocef®
Bronchitis chronisch, akute Exazerbation	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i> u. evtl. Enterobakterien/Pseudomonas ²	Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,3} Azithromycin ^{2,3,4} Levofloxacin ^{2,3}	Clavamox® Azithromycin Sandoz® Levofloxacin Sandoz®		Cefpodoxim-Proxetil ^{2,4} Cefuroxim-Axetil ^{2,4}	Biocef® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat®
Ambulant erworbene Pneumonie** (Jugendl. u. Erw.)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>M. catarrhalis</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> ²	Amoxicillin ³ (ohne Komorbiditäten) Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,3,4} (mit Komorbiditäten)	Ospamox® Clavamox®	7-14 Tage ²	Azithromycin ^{2,3} Clarithromycin ^{2,3,4} Roxithromycin ^{2,4} Levofloxacin ^{2,3,4} Cefuroxim-Axetil ² Cefpodoxim-Proxetil ²	Azithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz® Levofloxacin Sandoz® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat® Biocef®
Legionellose	Legionellen ²	Levofloxacin ²	Levofloxacin Sandoz®	7-10 Tage ¹	Azithromycin ² Roxithromycin ² Clarithromycin ²	Azithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz® Clarithromycin Sandoz®

Infektionen des Gastrointestinaltrakts

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Diarrhoe (Lebensmittelvergiftung)	Staphylokokken, Clostridien, Salmonellen, <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> u.a. ²	i.d.R. keine AB-Therapie indiziert – orale Hydratation im Vordergrund; Antibiotika bei Komplikationen ³		3-5 Tage ²	Azithromycin ² (bei Campylobacter u. Staphylokokken)	Azithromycin Sandoz®
Diarrhoe (Reisediarrhoe)	<i>E. coli</i> (ETEC), Shigellen, Salmonellen, Campylobacter, Yersinien, Amöben, Lamblien u.a. ²			3-5 Tage ²	Azithromycin ² (Campylobacterwirksamkeit)	Azithromycin Sandoz®
Unkomplizierte Divertikulitis	aerobe/anaerobe Mischinfektion ²	Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,3}	Clavamox®	7-10 Tage ²	Levofloxacin ^{2,3} (in Kombination mit Metronidazol) ²	Levofloxacin Sandoz®

Infektionen des Urogenitaltrakts

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Zystitis akut, unkompliziert	<i>E. coli</i> ²				Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,4} Levofloxacin ²	Clavamox® Levofloxacin Sandoz®
Zystitis rezidivierend	Enterobakterien, Enterokokken ²	Nur nach Antibiogramm ² : Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,4} Levofloxacin ² Cefpodoxim-Proxetil ²	Clavamox® Levofloxacin Sandoz® Biocef®	7-21 Tage ²		
Pyelonephritis unkompliziert, leichter Verlauf	Enterobakterien (über 70% <i>E. coli</i>) ²	Cefpodoxim-Proxetil ³ Amoxicillin/Clavulansäure ^{3,4} Levofloxacin ^{3,4} Cefuroxim-Axetil ^{2,4}	Biocef® Clavamox® Levofloxacin Sandoz® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat®	10 Tage ³ 10 Tage ³ 5 Tage ³		
Epididymitis	Chlamydien, Gonokokken, Enterobakterien ²	Levofloxacin ²	Levofloxacin Sandoz®	28 Tage ¹	Amoxicillin/Clavulansäure ²	Clavamox®
Gonorrhoe akut, unkompliziert	<i>N. gonorrhoeae</i> ²	Azithromycin in Kombination mit Ceftriaxon i.m. ³	Azithromycin Sandoz® in Kombination mit i.v. oder i.m. Ceftriaxon	single shot ^{3***}		

Klassische Infektionen

Indikationen	Häufige Erreger	Wirkstoffe	Sandoz-Produkt	Therapie-dauer#	Alternative Wirkstoffe	Sandoz-Produkt
Borreliose (Erythema migrans)	<i>Borrelia burgdorferi</i> ²	Amoxicillin ^{2,3} Penicillin V ²	Ospamox® Ospen® ⁴	14-21 Tage ²	Azithromycin ³ Cefuroxim-Axetil ^{2,4}	Azithromycin Sandoz® Cefuroxim Sandoz® I Zinnat®
Scharlach*	A-Streptokokken ²	Penicillin V ¹	Ospen®	10 Tage ¹	Cefalexin ¹ Clarithromycin ¹ Roxithromycin ¹ Clindamycin ^{1,3,4}	Ospexin® Clarithromycin Sandoz® Roxithromycin Sandoz® Clindac Sandoz®

Richtwert

* Erreger: β-hämolysierende A-Streptokokken (z. B. *S. pyogenes*)

** bei ausgeprägter Form i.v. Therapie notwendig

*** Resistenzen beachten

Die hier bereitgestellten Angaben beziehen sich auf die jeweiligen aktuellen Produkt-Fachinformationen (Stand Juli 2026) – https://medikamente.basg.gv.at/de/medicinal-products, abgerufen im August 2026; ergänzt um nationale Leitlinien und Empfehlungen.

1 Stille, Brodt, H.-R., Antibiotikatherapie, Stille 12. Auflage (2013), Schattauer-Verlag (Stuttgart)

2 Janata O., Antibiotika 2025, pm-Verlag (Kössen)

3 Arznei & Vernunft, Leitlinie Antiinfektiva 09/2018

4 Angaben laut Produkt-Fachinformation Stand 07/2026